

ВИЧ сегодня в России:



261 случай заражения
каждый день



52,2% случаев заражения
приходится на половой путь



Все возрастные группы
подвержены заболеванию

Сдай тест на ВИЧ. Сведи риск к нулю!



{ ВИЧ - положительный человек внешне ничем не отличается от остальных людей.
Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно. }



Касается каждого!



Если ты хотя бы раз вступал в половой контакт
без барьерного средства контрацепции или употреблял
инъекционные наркотики.

Кому необходимо сдать тест?

Тест на ВИЧ - это единственный достоверный способ узнать, есть вирус в крови или нет.



ВИЧ протекает бессимптомно, ты можешь не знать, что он у тебя есть.
А пока ты не знаешь, ты рискуешь заразить своего партнёра.



Если ВИЧ обнаружили, ты сможешь начать своевременный приём
препаролов. Лечение бесплатно.



Тест нужно сдать обязательно при планировании беременности.
Раннее выявление ВИЧ позволяет предпринять меры для защиты
будущего ребёнка от заражения.



Также, тест просто необходим для пар, которые решили отказаться от
использования барьерного средства контрацепции.

Важно помнить!

{ Постоянные отношения и брак защищают от ВИЧ, только если
оба партнёра прошли тест и хранят верность друг другу постоянно. }



Где сдать?

Тест на ВИЧ можно сдать в центрах СПИД и поликлиниках по месту жительства.
Результат теста сообщат только тебе. Тестирование бесплатно.

Можно ли привиться от ВИЧ?

На сегодняшний день вакцину и прививку, которые защитили бы от этой инфекции, не создали.



{ ВИЧ-инфекция сегодня - это хроническое заболевание.
Лечение ВИЧ-инфекции не даёт вирусу развиваться.
Но чтобы не заразиться достаточно соблюдать простые правила. }



Как можно защитить себя?



Воздерживаться от
половых контактов



Хранить верность
партнёру и
не допускать случайных
половых связей



Использовать барьерное
средство контрацепции
при каждом половом
контакте



Никогда
не употреблять
наркотики



ФОКУС-МЕДИА

Фонд социального развития и охраны здоровья



ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ЕЖЕГОДНО

357



НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИПП

СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ И ТРИХОМОНИАЗ



15-49 ЛЕТ

ИПП являются
основной предотвратимой
причиной бесплодия,
ОСОБЕННО У ЖЕНЩИН.



ПРИ ОТСУСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ
ИПП МОГУТ ИМЕТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО
**ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЁНКА.**

ОСНОВНЫМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВОЙ,
НО ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЯХ ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:
КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ, ВНУТРИУТРОБНЫЙ, ЧЕРЕЗ КРОВЬ.

ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ МОГУТ
БЫТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ,
ЯЗВОЧКИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ,
МИКРОТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ЗУД ИЛИ
ЖЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ИЛИ
ПОЛОВОГО КОНТАКТА.



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ПРИ ИНФЕКЦИЯХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,
НЕ ПРОИСХОДИТ САМОЗАЛЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗМА. ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ СИМПТОМЫ ИСЧЕЗАЮТ - ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕХОДА
ЗАБОЛЕВАНИЯ В СКРЫТУЮ ФОРМУ.



ИНФИЦИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫМИ
ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ
К РАЗВИТИЮ РАКА ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ, В ЧАСТОСТИ, РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН.



НАДЁЖНЫМИ МЕРАМИ
ПРОФИЛАКТИКИ ИПП ЯВЛЯЮТСЯ:
ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВЫХ
КОНТАКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА
КОНТРАЦЕПЦИИ ПРИ КАЖДОМ
ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И РЕГУЛЯРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИПП.